

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,  
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée

- 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

### ABONNEMENT ANNUEL

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

- BULLETIN TECHNIQUE n° 190 -

Edition Grandes Cultures : n° 620 mai 1981

### / CEREALES D'HIVER /

**BLES** : Stade moyen 10-2 (quart de l'épiaison achevée), fonction des variétés (tout début épiaison sur TOP, alors que celle-ci se termine sur CASTAN et TALENT en particulier).

**ORGE** : Stade moyen 10-5-2 (pleine floraison).

#### 1) SUR BLE

Depuis l'envoi de notre dernier bulletin, l'évolution des maladies sur les trois dernières feuilles peut être ainsi résumée :

- Progression lente de la Septoriose : *Septoria nodorum* dont le risque de manifestation sur épis est important remplace progressivement *Septoria tritici*.

- Aggravation de la Rouille brune dans les situations où elle était déjà observée, alors que peu de nouvelles parcelles paraissent contaminées.

- Progression sensible de l'Oïdium, observé dans près de 20 % des situations, présent parfois sur la dernière feuille.

Dans les parcelles où aucune application fongicide n'a encore été réalisée, il est conseillé d'intervenir si la Rouille brune, la Septoriose, ou les deux à la fois, sont observées sur les trois dernières feuilles.

Compte-tenu de la présence anormalement importante de l'Oïdium cette année, choisir un produit ayant également une action contre ce champignon.

Le choix portera, de préférence, sur l'un des produits ci-après :

- |   |   |
|---|---|
| - carbendazime + prochloraz (SPORTAK PF - 1,5 kg/ha)            | ) pour lutter contre l'association Septoriose-Oïdium    |
| - triadiméfon (BAYLETON 25 - 0,5 kg/ha)                         | }   |
| - dichlobutrazol (VIGIL - 1 l/ha)                               |   |
| - fenpropimorphe (CORBEL - 1 l/ha)                              |   |
| - carbendazime + manèbe + fénarimol (RIMIDINE PLUS, 2,5 kg/ha)  |   |
| - carbendazime + oxycarboxine + fénarimol (SPLENDOR, 2,5 kg/ha) | ) pour lutter contre l'association Rouille brune-Oïdium |
| - captafol + triadiméfon (BAYLETON CF EPI - 2 kg/ha)            | }   |
| - dichlobutrazol + carbendazime (VIGIL K - 1,25 l/ha)           |   |
| - C.G.A. 64250 (TILT 125 - 1 l/ha)                              |   |

P.1.252

**IMPORTANT**

Les traitements fongicides ne s'imposent pas partout.

Pour éviter des dépenses inutiles, les céréaliculteurs doivent visiter soigneusement leurs parcelles avant de prendre une décision.

**2) SUR ORGE**

Pas d'intervention spécifique à envisager.

**Erratum**

Dans notre dernier bulletin (Edition Grandes Cultures du 7 mai 1981), il fallait lire (dans le choix des produits) :

- BLEDOR 3 - 12,5 kg/ha (au lieu de 1,25 kg/ha)
- TILT 125 (à base de CGA 64250).

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription Phytosanitaire "MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : J. THIAULT.

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.